



CALENDÁRIO DE VACINAS DE 0 A 11 ANOS

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS	DISPONIBILIZAÇÃO	
				SUS	PARTICULAR
AO NASCER	BCG-ID	dose única	Previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meningea	SIM	SIM
	Hepatite B	1ª dose	Previne a hepatite B	SIM	SIM
	VOP/VIP	1ª dose	Previne a poliomielite	SIM	A DTP hexavalente já inclui a VIP
2 MESES	DTP/DTPa ¹	1ª dose	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>	Pentavalente (DTPw)	Hexavalente (DTPa + VIP)
	Pneumocócica (conjugada)	1ª dose	Previne a pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo	10-valente	13-valente
	Rotavírus humano	1ª dose	Previne diarreia por rotavírus	Monovalente	Pentavalente
3 MESES	Meningocócica C e 1ª dose ACWY ²	1ª dose	Previne doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> dos sorogrupos A, C, W e Y	Meningo C	Meningo ACWY
	Meningocócica B	1ª dose	Previne doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo B	NÃO	SIM
4 MESES	VOP/VIP	2ª dose	Previne a poliomielite	SIM	A DTP hexavalente já inclui a VIP
	DTP/DTPa	2ª dose	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>	Pentavalente (DTPw)	Hexavalente (DTPa + VIP)
	Pneumocócica (conjugada)	2ª dose	Previne a pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo	10-valente	13-valente
	Rotavírus humano	2ª dose	Previne diarreia por rotavírus	Monovalente	Pentavalente
5 MESES	Meningocócica C e 2ª dose ACWY ²	2ª dose	Previne doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> dos sorogrupos A, C, W e Y	Meningo C	Meningo ACWY
	Meningocócica B	2ª dose	Previne doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo B	NÃO	SIM
6 MESES	VOP/VIP	3ª dose	Previne a poliomielite	SIM	A DTP hexavalente já inclui a VIP
	DTP/DTPa	3ª dose	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>	Pentavalente (DTPw)	Hexavalente (DTPa + VIP)
9 MESES	Vacina contra febre amarela	dose única	Previne a febre amarela	SIM	SIM
12 MESES	Tetraviral	1ª dose	Previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela (catapora)	SIM	SIM
	Meningocócica C e Reforço ACWY		Previne doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> dos sorogrupos A, C, W e Y	Meningo C	Meningo ACWY
	Pneumocócica (conjugada)	Reforço	Previne a pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo	10-valente	13-valente
15 MESES	VOP/VIP	1º reforço	Previne a poliomielite	SIM	A DTP hexavalente já inclui a VIP
	DTP/DTPa	1º reforço	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>	Pentavalente (DTPw)	Hexavalente (DTPa + VIP)
	Hepatite A	Dose única	Previne hepatite A	SIM	SIM
	Tetraviral	Reforço	Previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela (catapora)	SIM	SIM
4 ANOS	VOP/VIP	2º reforço	Previne a poliomielite	SIM	A DTP hexavalente já inclui a VIP
	DTP/DTPa	2º reforço	Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>	Pentavalente (DTPw)	Hexavalente (DTPa + VIP)
	Varicela atenuada	Dose única	Previne a varicela (catapora)	SIM	SIM
5 ANOS	Meningocócica C e Reforço ACWY		Previne doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> dos sorogrupos A, C, W e Y	Meningo C	Meningo ACWY
9 ANOS (meninas)	HPV ³	2 doses, 6 meses de intervalo entre as doses	Previne o papiloma vírus humano, que causa cânceres e verrugas genitais	SIM	SIM
11 ANOS (meninos)	HPV ³	2 doses, 6 meses de intervalo entre as doses	Previne o papiloma vírus humano, que causa cânceres e verrugas genitais	SIM	SIM

1- O uso da vacina DTPa é preferível ao da DTPw, pois os eventos adversos associados com sua administração são menos frequentes e intensos.

2- No SUS, a menACWY é disponibilizada apenas para crianças entre 11 e 12 anos.